



Centro Mujer y Salud

Edificio Principal
Oficina A-234
Recinto de Ciencias Médicas
Río Piedras, PR 00935

(787)758-2525
Exts. 1368, 2284

Línea directa
(787)753-0090

centromujerysalud.rcm.upr.edu

Dra. Edna Pacheco-Acosta
Directora
Editora BoletínA

Dra. Yiselly Vázquez-Guzmán
Directora Asociada
Editora Asociada BoletínA

Apoyo en la redacción:
Andrea Pacheco Díaz
Estudiante graduada

Las vacunas contra el VPH se suministran en una serie de inyecciones. Para las personas entre 15 y 45 años, la vacuna tiene tres dosis separadas en un período de seis meses. Las personas entre 9 y 14 años, sólo necesitan dos dosis.

La detección temprana del cáncer cervical

El cáncer cervical se desarrolla en el cuello uterino, que es la abertura inferior y estrecha del útero que conduce hasta la vagina. En Puerto Rico, entre 2010-2014, representó el 3.5% de todos los casos de cáncer diagnosticados en mujeres.

Datos


- Según las estadísticas más recientes del Registro Central de Cáncer (2017):
 - La incidencia de cáncer cervical en Puerto Rico es de 13.9 por cada 100,000 mujeres.
 - En promedio, 253 mujeres fueron diagnosticadas anualmente con cáncer cervical invasivo entre 2010 y 2014.



Detección temprana

- El cáncer cervical, en sus etapas iniciales, no muestra síntomas, por lo que se recomienda que se realice el cernimiento rutinario:
 - **20-29 años:** prueba de Papanicolaou cada 3 años (a partir de los 25 años, puede cambiar a la prueba del VPH).
 - **30-65 años:** prueba de Papanicolaou y prueba del VPH (conjunta) cada 5 años, o solo una prueba de Papanicolaou o de VPH cada 3 años.
 - **66+:** es posible que ya no necesite la prueba de Papanicolaou. Se requiere consulta médica.
- La mayoría de los casos de cáncer cervical son causados por algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH), por lo que se recomienda que durante las relaciones sexuales se utilicen condones y/o barreras de látex bucales para prevención de ésta u otras infecciones de transmisión sexual.

Síntomas



Cuello uterino visto a través de un espéculo durante un examen pélvico

En etapas más avanzadas del cáncer cervical, algunos síntomas pueden ser:

- Sangrado vaginal anormal (después del sexo vaginal, postmenopausia o entre periodos menstruales)
- Secreción vaginal inusual
- Dolor durante las relaciones sexuales